



ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА

Вакцинация БЦЖ проводится в роддоме при отсутствии медицинских противопоказаний.

Дети, не привитые БЦЖ в роддоме, вакцинируются в поликлинике по месту жительства.


ВАКЦИНАЦИЯ ПРИ COVID-19

Вакцинация от COVID-19 выполняется при отсутствии медицинских противопоказаний в поликлинике по месту жительства, с 12 лет.

Больным ТУБЕРКУЛЕЗОМ вакцинация от COVID-19 выполняется в поликлиниках по месту жительства при отсутствии прогрессирования ТУБЕРКУЛЕЗНОГО процесса.

Как защитить себя и близких от ТУБЕРКУЛЕЗА и COVID-19?

СОБЛЮДАЙТЕ:




Дистанцию 1,5 метра



Гигиену кашля



Гигиену рук




Масочный режим




Гигиену помещения



ПЦР тест на ТУБЕРКУЛЕЗ-GeneXpert и ПЦР тест на COVID-19



БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!



ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА И COVID-19 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РАЗВИТИЕ ТЯЖЕЛЫХ И СМЕРТЕЛЬНЫХ ФОРМ ЗАБОЛЕВАНИЯ

[WWW.NNCF.KZ](http://www.nncf.kz)

[nncf.kz](https://www.facebook.com/nncf.kz) [nncf_mz_rk](https://www.instagram.com/nncf_mz_rk)

ТУБЕРКУЛЕЗ И COVID-19

ПРОЕКТ ГРАНТА ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА ПО ТБ В КАЗАХСТАНЕ НА 2020-2022 гг.

СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА и COVID-19:


СИМПТОМЫ	ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ	ПРИ COVID-19
Кашель	да /более 2 недель/	да
Боль в горле, першение	нет	да
Температура тела	37°C чаще в вечернее время	38°C и выше
Одышка	да в запущенных и осложненных формах	иногда
Слабость, недомогание	да, часто вечером	иногда
Отсутствие аппетита	да	не всегда
Похудание	да	нет
Боль в мышцах	нет	часто
Потливость	да, чаще ночная	иногда



Оба заболевания передаются через воздух, от человека к человеку.

COVID-19 развивается после контакта даже с бессимптомным носителем, туберкулез может развиваться при контакте с больным легочным ТУБЕРКУЛЕЗОМ.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СИМПТОМЫ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ НА ТУБЕРКУЛЕЗ и COVID-19?



- 1 Обратиться к врачу /в фильтр кабинет по месту жительства либо вызвать скорую помощь
- 2 Начинать лечение только по предписанию врача
- 3 Помнить, что нельзя лечиться самостоятельно или на примере соседей /друзей/ родственников, которые вылечились от туберкулеза и COVID-19

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ!


Человек с COVID-19 в момент контакта инфицирует от 2 до 4 человек, бессимптомный инфекционный период при COVID-19 длится от 2 до 14 дней!

Один больной с активным Туберкулезом за год может инфицировать 10-15 человек, бессимптомный период при ТУБЕРКУЛЕЗЕ может быть длительным!

ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА И COVID-19


ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ

Исследование на туберкулез мокроты и другого материала ПЦР методом - GeneXpert, результат в течении 1 дня



ПРИ COVID-19

Исследование мазков из зева и носа методом ПЦР



Исследование на ТУБЕРКУЛЕЗ и COVID-19 доступно во всех регионах Казахстана

Обследование и лечение при подозрении на ТУБЕРКУЛЕЗ и COVID-19 в Республике Казахстан проводится БЕСПЛАТНО!